



РАПС

	Обработка	Спектр применения							
Семена	Протравливание	Крестоцветные блошки	Имидасид, КС 3,0-6,0 л/т						
			Кайтокс, КС 8,0-10,0 л/т						
Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения.	Рузмин, ВР 2,0-8,0 л/га						
				Зенарил, ВР 0,3-0,35 л/га	Зенарил, ВР 0,3-0,35 л/га				
				Квизурил, КЭ 0,7-1,5 л/га	Квизурил, КЭ 0,7-1,5 л/га				
		Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополовое); многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Клерк, КЭ 0,2-1,0 л/га	Клерк, КЭ 0,2-1,0 л/га					
Вредители	Инсектицидная обработка	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, капустная моль, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	Альфатек, КЭ 0,1-0,15 л/га	Альфатек, КЭ 0,1-0,15 л/га					
			Фактория, МКС 0,05-0,1 л/га	Фактория, МКС 0,05-0,1 л/га					
			Раймир, КЭ 0,5-0,6 л/га	Раймир, КЭ 0,5-0,6 л/га					
Уборка	Десикация	Подсушивание растений						Диквабис, ВР 2,0 л/га	
	Фенофазы	До посева	Всходы	Формирование розетки	Бутонизация	Начало цветения	Цветение	Созревание	

Схема носит информационный характер и требует индивидуального уточнения.