



ЗЕРНОВЫЕ

Обработка	Спектр применения
-----------	-------------------

Семена	Протравливание	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян. Внутристеблевые мухи, хлебные блошки; хлебная жужелица	Анкер Трио, КС 0,4-0,5 л/т	
			Имидасид, КС 0,3-0,6 л/т	
			Кайтокс, КС 0,5 л/т	
Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Рузмин, ВР 2,0-8,0 л/га	
			Царумин, ВК 1,0-1,5 л/га	Царумин, ВК 1,0-1,5 л/га
			Флортек, СЭ 0,3-0,5 л/га	Флортек, СЭ 0,3-0,5 л/га
			Бенрил, ВДГ 0,01-0,025 л/га	Бенрил, ВДГ 0,01-0,025 л/га
			Бентилон, ВР 2,0-4,0 л/га	Бентилон, ВР 2,0-4,0 л/га
Вредители	Инсектицидная обработка	Клоп вредная черепашка, блошки, злаковые тли, цикадки, трипсы, пьявица, хлебная жужелица, мухи злаковые внутристеблевые, хлебные блошки, хлебные жуки	Альфатек, КЭ 0,1-0,15 л/га	Альфатек, КЭ 0,1-0,15 л/га
			Диметек, КЭ 1,0-1,5 л/га	Диметек, КЭ 1,0-1,5 л/га
			Сайдор, ВРК 0,15-0,2 л/га	Сайдор, ВРК 0,15-0,2 л/га
			Раймир, КЭ 0,75-1,0 л/га	Раймир, КЭ 0,75-1,0 л/га
			Фактория, МКС 0,1-0,2 л/га	Фактория, МКС 0,1-0,2 л/га
Болезни	Фунгицидная обработка	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания, мучнистая роса, гельминтоспориоз; ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев, пиренофороз	Карзитек, КС 0,3-0,6 л/га	Карзитек, КС 0,3-0,6 л/га
				Тузол, КЭ 0,4-0,5 л/га

Фенофазы

До посева

3 листа

Кущение

Трубкавание

Флаговый лист

Колошение

Цветение

Налив зерна

Схема носит информационный характер и требует индивидуального уточнения.